



Vermicida para cães

Uso
Veterinário

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Comprimidos para tratar 10 kg de peso:	
Praziquantel.....	50 mg
Pamoato de pirantel.....	144 mg
Febantel.....	150 mg
Excipiente q.s.p.....	660 mg
Comprimidos para tratar 35 kg de peso:	
Praziquantel.....	175 mg
Pamoato de pirantel.....	504 mg
Febantel.....	525 mg
Excipiente q.s.p.....	2.310 mg

INDICAÇÕES

Drontal® Plus é especialmente indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais e da giardíase em cães, apresentando excelente atividade contra os seguintes parasitos:

Cestóides (vermes chatos):

- *Taenia multiceps*
- *Taenia pisiformis*
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia evile*
- *Echinococcus granulosus*
- *Taenia taeniaeformis*
- *Echinococcus multilocularis*
- *Joyeuxiella pasqualei*
- *Mesocestoides* spp.
- *Taenia hydatigena*

Nematódeos (vermes redondos):

- *Ancylostoma braziliense*
- *Ancylostoma caninum*
- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Trichuris vulpis*
- *Uncinaria stenocephala*

Protozoários:

- *Giardia* spp.

MODO DE USAR E DOSAGENS

Verifique o peso de seu cão a fim de calcular a dose correta para o tratamento.

O esquema abaixo fornece as doses recomendadas para as diferentes faixas de peso dos cães:

Comprimidos de 660 mg: 1 comprimido trata 10 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães até 2,0 kg	1/4 de comprimido ☹
de 2,1 a 5 kg	1/2 de comprimido ☹
de 5,1 a 10 kg	1 comprimido ☹

Comprimidos de 2.310 mg: 1 comprimido trata 35 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 15 a 17,5 kg	1/2 de comprimido ☹
de 17,6 a 35 kg	1 comprimido ☹

Os comprimidos podem ser fracionados e/ou conjugados para tratar os animais de forma prática, com dosagens mais precisas, por exemplo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 45 kg	1 comprimido de 660 mg ☹ + 1 comprimido de 2.310 mg ☹

Para o tratamento das verminoses intestinais, Drontal® Plus deve ser administrado por via oral em dose única.

Contra a giardíase, administrar o produto na dosagem recomendada, uma vez por dia, durante três dias consecutivos.

Os comprimidos podem ser misturados à ração ou à carne, sendo muito bem tolerados e dispensando regime especial ou jejum prévio.

RECOMENDAÇÕES

Uma única dose de Drontal® Plus elimina os cestóides e nematódeos presentes no intestino do cão. Porém, as larvas de nematódeos que estejam migrando pelo organismo do animal chegarão ao intestino em diferentes intervalos de tempo, peculiares a cada espécie de verme, estabelecendo uma nova infestação. Somam-se a elas as larvas e ovos adquiridos do ambiente contaminado. Assim sendo, faz-se necessário repetir o tratamento após um determinado tempo, de acordo com o período pré-patente do verme diagnosticado, que deve ser avaliado pelo médico veterinário com base na espécie de verme, no ambiente e no manejo do cão.

Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, deve-se tratar de forma integrada o cão e o ambiente, a fim de controlar as pulgas, hospedeiras intermediárias deste verme chato.

Cada *Ancylostoma caninum* adulto ingere cerca de 0,1 mL de sangue por dia, e infestações severas costumam ser fatais para os filhotes. As larvas desse verme passam da glândula mamária ao leite, penetram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do ambiente contaminado. Já o *Toxocara canis* infesta os filhotes atravessando a barreira placentária, chegando ao leite através da glândula mamária; ou pela ingestão dos ovos. A cadela pode eventualmente adquirir o verme ingerindo aves ou roedores. Larvas desses dois últimos vermes permanecem inativas na musculatura da cadela, produzindo infestações por diversas crias consecutivas. Por esta razão, recomenda-se o tratamento da fêmea antes da cobertura e 10 dias antes do parto. Os filhotes podem ser tratados durante a lactação a partir de 2, 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Deve-se vermifugar a cadela ao mesmo tempo que a ninhada. Os cães adultos podem ser vermifugados a cada três meses. Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente, com produtos à base de cloro ativo, efetivo contra larvas e ovos dos vermes.

Os cestóides e os nematódeos dos cães representam também um sério risco para humanos.

Para o controle da giardíase é importante oferecer aos cães água clorada e filtrada, trocando-a várias vezes ao dia. Lavar diariamente os bebedouros e desinfetar o ambiente com produtos à base de amônia quaternária, porque os cistos de *Giardia* spp. sobrevivem no ambiente e são uma fonte de reinfestação para os cães.

A remoção imediata das fezes do cão limita a contaminação do ambiente por vermes e

protozoários.

Consulte o médico veterinário para adequar o tratamento com Drontal® Plus a cada situação particular.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não administrar Drontal® Plus para gatos.

REAÇÕES ADVERSAS

Os estudos de toxicidade sobre este produto indicam uma ampla margem de segurança para cães, sem contra-indicações ou efeitos colaterais, podendo inclusive ser utilizado durante a gestação e lactação, conforme esquema de tratamento proposto. Após o tratamento, animais altamente infestados por vermes podem apresentar vômitos, diarreias e apatia, causados pela morte e desintegração destes parasitos no intestino do cão. A presença de vermes inteiros ou fragmentos de vermes nas fezes do cão tratado é indicativo de grandes cargas parasitárias.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do médico veterinário. LEVE SEU CÃO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO

Cartuchos com blíster contendo dois ou quatro comprimidos de 660 mg cada um e cartuchos com blíster contendo dois comprimidos de 2.310 mg cada um.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 3047, em 22/09/88

Fabricado segundo fórmula original da Bayer da Alemanha.

Proprietário e fabricante:

Bayer S.A.

Rua Domingos Jorge, 1100
São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Responsável técnico:
Mário Eduardo Pulga
CRMV-SP nº 2715

Indústria brasileira



Bayer

Se é Bayer, é bom.

99363662AA