



Vermicida - Giardicida

Uso Veterinário

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Comprimidos para tratar 10 kg de peso:

Praziquantel	50 mg
Pamoato de pirantel	144 mg
Febantel	150 mg
Excipiente q.s.p	776,5 mg

Comprimidos para tratar 35 kg de peso:

Praziquantel	175 mg
Pamoato de pirantel	504 mg
Febantel	525 mg
Excipiente q.s.p	2.718 mg

INDICAÇÕES

Drontal® plus sabor carne é especialmente indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais e da giardíase em cães, apresentando excelente atividade contra os seguintes parasitos:

Cestóides (vermes chatos):

- *Taenia multiceps*
- *Taenia pisiformis*
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia ovis*
- *Echinococcus granulosus*
- *Taenia taeniaeformis*
- *Echinococcus multilocularis*
- *Joyeuxiella pasqualei*
- *Mesocestoides* spp.
- *Taenia hydatigena*

Nematódeos (vermes redondos):

- *Ancylostoma braziliense*
- *Ancylostoma caninum*
- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Trichuris vulpis*
- *Uncinaria stenocephala*

Protozoários:

- *Giardia* spp.

MODO DE USAR E DOSAGENS

Verifique o peso de seu cão a fim de calcular a dose correta para o tratamento.

O esquema abaixo fornece as doses recomendadas para as diferentes faixas de peso dos cães:

Comprimidos de 776,5 mg:

1 comprimido trata 10 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães até 2,0 kg	1/4 de comprimido
de 2,1 a 5 kg	1/2 de comprimido
de 5,1 a 10 kg	1 comprimido

Comprimidos de 2.718 mg:

1 comprimido trata 35 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 15 kg a 17,5 kg	1/2 de comprimido
de 17,6 kg a 35 kg	1 comprimido

Os comprimidos podem ser fracionados e/ou conjugados para tratar os animais de forma prática, com dosagens mais precisas, por exemplo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 45 kg	1 comprimido de 776,5 mg
	+ 1 comprimido de 2.718 mg

Para o tratamento das verminoses intestinais, Drontal® plus sabor carne deve ser administrado por via oral em dose única.

Contra a giardíase, administrar o produto na dosagem recomendada uma vez por dia, durante três dias consecutivos.

Drontal® plus sabor carne possui moderno componente palatável que facilita a aceitação do comprimido pelos animais. Caso necessário, os comprimidos podem ser misturados à ração ou à carne, sendo muito bem tolerado e dispensando regime especial ou jejum prévio.

Se a dosagem utilizada for inferior a 1 comprimido, o restante deste comprimido deve ser descartado.

Os comprimidos que permanecerem fechados no blíster podem ser utilizados normalmente dentro do prazo de validade.

RECOMENDAÇÕES

Uma única dose de **Drontal® plus sabor carne** elimina os cestóides e nematódeos presentes no intestino do cão. Porém, as larvas de nematódeos que estejam migrando pelo organismo do animal chegarão ao intestino em diferentes intervalos de tempo, peculiares a cada espécie de verme, estabelecendo uma nova infestação. Somam-se a elas as larvas e ovos adquiridos do ambiente contaminado. Assim sendo, faz-se necessário repetir o tratamento após um determinado tempo, de acordo com o período pré-patente do verme diagnosticado, que deve ser avaliado pelo médico veterinário com base na espécie de verme, no ambiente e no manejo do cão.

Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, deve-se tratar de forma integrada o cão e o ambiente, a fim de controlar as pulgas, hospedeiras intermediárias deste verme chato.

Cada *Ancylostoma caninum* adulto ingere cerca de 0,1 mL de sangue por dia, e infestações severas costumam ser fatais para os filhotes. As larvas desse verme passam da glândula mamária ao leite, penetram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do ambiente contaminado. Já o *Toxocara canis* infesta os filhotes atravessando a barreira placentária, chegando ao leite através da glândula mamária; ou pela ingestão dos ovos. A cadela pode eventualmente adquirir o verme ingerindo aves ou roedores. Larvas desses dois últimos vermes permanecem inativas na musculatura da cadela, produzindo infestações por diversas crias consecutivas. Por esta razão, recomenda-se o tratamento da fêmea antes da cobertura e 10 dias antes do parto. Os filhotes podem ser tratados durante a lactação e após o desmame, com 2, 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Deve-se vermifugar a cadela ao mesmo tempo que a ninhada. Os cães adultos podem ser vermifugados a cada três meses.

Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente, com produtos à base de cloreto ativo, efetivo contra larvas e ovos dos vermes.

Os cestóides e nematódeos dos cães representam também um sério risco para humanos.

Para o controle da giardíase é importante oferecer aos cães água clorada e filtrada, trocando-a várias vezes ao dia. Lavar diariamente os

bebedouros e desinfetar o ambiente com produtos à base de Amônia quaternária porque os cistos de *Giardia* spp. sobrevivem no ambiente e são uma fonte de reinfestação para os cães.

A remoção imediata das fezes do cão limita a contaminação do ambiente por vermes e protozoários.

Consulte o médico veterinário para adequar o tratamento com **Drontal® plus sabor carne** a cada situação particular.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar **Drontal® plus sabor carne** para gatos.

REAÇÕES ADVERSAS

Os estudos de toxicidade sobre este produto indicam uma ampla margem de segurança para cães, sem contraindicações ou efeitos colaterais, podendo inclusive ser utilizado durante a gestação e lactação, conforme esquema de tratamento proposto. Após o tratamento, animais altamente infestados por vermes podem apresentar vômitos, diarreias e apatia, causados pela morte e desintegração destes parasitas no intestino do cão. A presença de vermes inteiros ou fragmentos de vermes nas fezes do cão tratado é indicativo de grandes cargas parasitárias. Doses muito elevadas podem provocar vômitos em animais sensíveis.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

LEVE SEU CÃO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos com blíster contendo dois ou quatro comprimidos de 776,5 mg cada um e cartuchos com blíster contendo dois comprimidos de 2.718 mg cada um.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.798, em 16/02/2004.

Proprietário da Fórmula:
Bayer Animal Health GmbH -
Leverkusen - Alemanha

Fabricante:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Kiel - Alemanha

Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:

Bayer S.A
Rua Domingos Jorge, 1100
São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Responsável técnica:

Léa B. H. Lucas
CRMV-SP 8290

Produto Importado



Bayer